

Prior to use, carefully read the instructions for use.

GC Tooth Mousse

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE
For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP: Kazein Fosforanetat – Амфориан Кальция Фосфат). Korogo CPP-ACP (Casein Phosphopeptide – Амфориан Кальций Фосфат). When CPP-ACP is applied in the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bioactive calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are retained in the mouth, the more effective the result.

Applied paste containing bio-available calcium and phosphate

1. Replace cap after use.
2. Helps neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE INDICATIONS

- a. Prior to and following in-office bleaching.
- b. After ultrasonic, hand scaling or root planing.
- c. Following periodontal surgery (P.T.C.).
- d. After application of topical fluoride.
- e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
- f. During orthodontic treatment.
- g. For high risk caries patients.
- h. For special needs patients.

In-office application:

1. Custom Tray Application

1. Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to upper and/or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to retain for as long as possible (1- 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non-tray application:

1. If the patient remains, allow any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or paper. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or in difficult interproximal areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Apply a sufficient amount for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1-2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:

II. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1- 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1- 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVOURS
Strawberry (S), Melon (M), Vanilla (V), Mint (I), Tutti-Frutti (T)
Note: S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S..... Strawberry

STORAGE
Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C (46-47.0°F)).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES
Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Package 10 x 40g (2 each) of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti)
2. Single Flavour Package 10 x 40g in each flavour
Vanilla, Strawberry, Melon, Tutti-Frutti, Mint
3. Refill Package 1 x 40g tube in each flavour

NOTE
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology is used by other patients or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms occur, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product such as a flavouring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

AROMATI
Ягода (S), Пшеница (M), Ванилия (V), Мента (I), Туги-Фруити (T)
Забелка: S, M, V, I и T в скобках са съкращения за всеки аромат. Тези съкращения се отбелязват на тубите, след паричния номер, за да укажат вида на аромата.
Например, 021003S.....Ягода

СЪСТАВ
Съдържава ванилин и сушо място с висока влажност, дълец от директна слънчева светлина (8-25°C (46.4-77.0°F)).
(Срок за употреба: 2 години от датата на производство)

ПАКЕТИРОВАНИЕ
Туби съдържава 40g (35mL)
1. Асортин пакетче 10 x 40g (2 от всяко) от Ягода, Пшеница, Ванилия, Мента, Туги-Фруити)
2. Пакетче от един аромат 10 x 40g от всяко аромат
3. Рефил пакетче 1 x 40g туба от всеки аромат

ЗАБЕЛЕЖКА
GC Tooth Mousse с неговата уникална формула е разработен в Стомотологичния Факултет на Университета в Мелбърн, Виктория, Австралия.
*RECALDENT е търговска марка използвана под лиценз. CPP-ACP технологията е свързана с патенти и патентни правта в Австралия, НЗ, Европа, Канада и САЩ.

ВНИМАНИЕ
1. Винаги поставяйте капачката след употреба и отстранявайте остатъците от паста около отвора на тубата или във вътрешността на капачката.
2. В случай на контакт с очите, промийте незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.
3. При попадане върху очите, отмийте с вода.
4. Ако се проявят симптоми на ангиоедем, това може да е сигнал за чувствителност или алергия към бензоатните консерванти, или към някои от другите съставки на продукта, като ароматизиращите агенти. В такъв случай, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

ВНИМАНИЕ
1. Всегда ставяйте капачката след употреба и отстранявайте остатъците от паста около отвора на тубата или във вътрешността на капачката.
2. В случае на контакт с очами, промойте незабавно с вода и потърсете лекарска помощь.
3. При попадане върху зрение, отмойте с вода.
4. Ако се проявят симптомы на ангиоедем, это может быть сигналом к чувствительности или аллергии ким бензоатным консервантам, или к некоторым другим составляющим продукта, таким ароматизирующим агентам. В таком случае, прекратите употребление на продукта и обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ
1. Siempre sustituya el tapón después de usar el producto y elimine los restos de pasta o humedad alrededor del tubo o dentro de la tapa.
2. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
3. En caso de erupción en la cara, o hinchazón de la cara, esto puede ser un signo de sensibilidad o alergia a los conservantes de benzoato, o a algún otro componente del producto tal como un saborizante. En este caso, deje de usar el producto y consulte a un médico.

ВНИМАНИЕ
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms occur, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product and refer to a physician

ВНИМАНИЕ
1. Всегда ставяйте капачката след употреба и отстранявайте остатъците от паста около отвора на тубата или във вътрешността на капачката.
2. В случай на контакт с очите, промийте незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.
3. При попадане върху очите, отмийте с вода.
4. Ако се проявят симптоми на ангиоедем, това може да е сигнал за чувствителност или алергия към бензоатните консерванти, или към някои от другите съставки на продукта, като ароматизиращите агенти. В такъв случай, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.

ВНИМАНИЕ
1. Siempre sustituya el tapón después de usar el producto y elimine los restos de pasta o humedad alrededor del tubo o dentro de la tapa.
2. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
3. En caso de erupción en la cara, o hinchazón de la cara, esto puede ser un signo de sensibilidad o alergia a los conservantes de benzoato, o a algún otro componente del producto tal como un saborizante. En este caso, deje de usar el producto y consulte a un médico.

ВНИМАНИЕ
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms occur, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product and refer to a physician

ВНИМАНИЕ
1. Siempre sustituya el tapón después de usar el producto y elimine los restos de pasta o humedad alrededor del tubo o dentro de la tapa.
2. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
3. En caso de erupción en la cara, o hinchazón de la cara, esto puede ser un signo de sensibilidad o alergia a los conservantes de benzoato, o a algún otro componente del producto tal como un saborizante. En este caso, deje de usar el producto y consulte a un médico.

ВНИМАНИЕ
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms occur, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product and refer to a physician

ВНИМАНИЕ
1. Siempre sustituya el tapón después de usar el producto y elimine los restos de pasta o humedad alrededor del tubo o dentro de la tapa.
2. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
3. En caso de erupción en la cara, o hinchazón de la cara, esto puede ser un signo de sensibilidad o alergia a los conservantes de benzoato, o a algún otro componente del producto tal como un saborizante. En este caso, deje de usar el producto y consulte a un médico.

GC Tooth Mousse

LOKALN KREM S BIO-NALHNIH KALCIJEM I FOSFATIM

За употреба само от стоматолози за препоручаните индикации.

Описание
GC Tooth Mousse е крем на водна основа, съдържащ RECALDENT™ (CPP-ACP: Казеин Фосфоранетат – Амфориан Калция Фосфат). Когато CPP-ACP се прилага на зъбите, то се свързва с биопленки, плака, бактерии, микрокислотната и меките твърди, като си осигури био-достъпни калций и фосфат.

Важно:
Слюнка повишава ефективността на CPP-ACP и ароматът ще стимулира слюноотделяне. Колкото по-дълго останат CPP-ACP и слюнка в устата, толкова по-ефективни е резултата.

Попаане паста, съдържаща био-достъпни калций и фосфат

1. Заменете капачката след употреба и отстранявайте остатъците от паста около отвора на тубата или във вътрешността на капачката.
2. Слюнка за неутрализиране на киселинната атака от ацидогените бактерии в плаката.
3. Слюнка за неутрализиране на киселинната атака от другите вътрешни и външни киселини източници.

КОНТРАИДИКАЦИИ
RECALDENT™ (CPP-ACP) се добива от млякена кашея. Не използвайте този материал при пациенти с доказана или подозирана алергия към млякени протеини или/и с чувствителност или алергия към бензоатни консерванти.

НАСОБИ ЗА УПОТРЕБА

1. Преди употреба внимателно прочетете инструкцие за употреба.
2. Преди и след използване в кабинета.
3. След ултразвукова или ръчно почистване на зъбен камък и коректан на кератозата или Sjögrens синдром.
4. След ултразвукова обработка на зъбна поврхност.
5. След ултразвукова обработка на зъбна поврхност.
6. След локална апликация на флуорид.
7. За да осигурите локално почиране при пациенти страдащи от ерозия, ксеростомия или Sjögrens синдром.
8. По време на ортодонто лечение.
9. При пациенти с висок риск от кариес.
10. При пациенти със специални нужди.

Клинично приложение:

- 1. Приложение в индивидуална лъжичка**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуалната лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и дръжте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
в. Оставете лъжичката в устата за минимум 3 минути.
г. Отстранете лъжичката.
д. Инструктирайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 2. Приложение в индивидуална лъжичка**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуалната лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 3. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 4. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 5. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 6. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 7. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 8. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 9. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 10. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 11. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 12. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 13. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 14. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 15. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 16. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 17. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 18. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 19. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ. Материалът трябва да се нанесне върху зъбните поврхности, използвайки мек и сух прст или пампука. В отбънне приложете интерпроксимални зъбни картъчки между дентални ит GC Tooth Mousse.
в. Оставете GC Tooth Mousse необзоказано върху зъбите за минимум 3 минути.
г. След това накарайте пациента да използва езика си, за да разнесе остатъците на GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да запази, колкото може по-дълго (1-2 минути), като избяга изплюване и се въздържа от преглъщане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултата.
- 20. Приложение в индивидуална лъжичка:**
а. Преди употреба внимателно изплавайте индивидуална лъжичка под течаща вода.
б. Натиснете достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количество, колкото грахово зърно е минималното необходимо за всяка зъбна дъ

Prehľad použitých a dôkladne pretestovaných prípravkov. **SK**

GC Tooth Mousse

DENTÁLNY KRÉM NA LOKÁLNU APLIKÁCIU V ÚSTACH S OBSAHOM VOĽNE DOSTUPNÉHO VÁPNIKA A FOSFÁTU

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

Charakteristika
GC Tooth Mousse je krém na báze vody, ktorý obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP; fosfopéptid kazeínu – amorfný fosforan vápenatý). Pri aplikácii do ústneho prostredia sa CPP-ACP viaže na biofilm, plak, baktérie, hydroxypapatit a maklé tkanivo a lokalizuje voľne dostupný vápnik a fosfát.

Dôležité:
Slinene zvyčajne účinnosť CPP-ACP a príruch napomáha stimulovať vylučovanie slín. Čím chýba sa CPP-ACP a sliny udržia v ústach, tým je účinný väčší.

Pasta na lokálnu aplikáciu s obsahom voľne dostupného kalcia a fosfátu
1. Používa zubom vyššieho ochrany.
2. Pomáha neutralizovať kyselinu z acidogénnych baktérií v plaku.
3. Pomáha neutralizovať kyselinu z ostatných zdrojov a vonkajších zdrojov kyselín.

KONTRAINDIKÁCIE
RECALDENT™ (CPP-ACP) ichlaha z mliečnej kazeína. Ne upotrebuje tieto materiály pri pacientoch z dokazom al na nemu na alergiu na mliečne proteíny alebo prečlivosťovosť, príp. alergiu na benzotové konzervačné látky.

KONTRAINDIKÁCIE
RECALDENT™ (CPP-ACP) je odvodený od mliečnej kazeína. Nepoužívať tento materiál u pacientov s preukázanou alebo suspektnou alergiou na mliečne proteíny alebo prečlivosťovosť, príp. alergiu na benzotové konzervačné látky.

NÁVOD NA POUŽITIE
INDIKÁCIE
a. Pred a po ambulantom bielení.
b. Po ultrazvukovom, ručnom scalingu alebo chladiení povrchu koreňa (root planing).
c. Po profesionálnom vyčistení zubov (P.T.C.).
d. Po lokálnej aplikácii fluoridu.
e. Na lokálne pokrytie (coating) u pacientov trpiacich eróziou, xerostómiou alebo Sjögrenovým syndrómom.
f. V priebehu ortodontickej liečby.
g. Na lokálne použitie pri vysokom riziku zubného kazu.
h. Pre pacientov s osobitnými potrebami.

Použitie v ambulácii:
I. Použitie nosiča
1. Nosič pred použitím dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
2. Do nosiča vylúčte väčšie množstvo GC Tooth Mousse a naneste na zubnú plochu. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse v ústach, tým je účinok vyšší.
3. Nosič nechte v ústach najmenšie 3 minúty.
4. Nosič vyberte.
5. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel jazykom v ústach a do najdlhšie ho v ústach zadržal (1-2 minúty) a usvolil sa nevyplávať ani neprechádza. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
6. Požadajte pacienta, aby dôkladne vyplul a ak je možné nevyplavalo. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
7. Ihneď po použití zvyškú GC Tooth Mousse v ústach opláchnite alebo vyčistíte kefou pod tečúcou vodou.

I. Použitie bez nosiča:
1. Ak je to potrebné, nabyčobno slininy na povrchu zuba odstráňte vatovým tampónom. Na každom pripade NIE je potrebné zuby sušiť stlačeným vzduchom.
2. Naneste GC Tooth Mousse na povrch zuba aplikujúcim tampónom, miestach pomocou interproximálnej kefkou na čistenie zubov.
3. GC Tooth Mousse nechte najmenšie 3 minúty pôsobiť.
4. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrel po celých častiach denticie a čo najdlhšie v ústach podržal (ešte 1-2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
5. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel jazykom v ústach a do najdlhšie ho v ústach zadržal (1-2 minúty) a usvolil sa nevyplávať ani neprechádza. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
6. Požadajte pacienta, aby dôkladne vyplul a ak je možné, nevyplavalo. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.

Domača úprava:
I. Použitie počas dňa po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného lekára
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1-2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

II. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

III. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

IV. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

PRÍCHUTE
Jahoda (S), melón (M), vanília (V), máta (I), Tutti-Frutti (T)
Poznámka: S, M, V, I a T v zákrhoch sú skratky pre jednotlivé príchute. Tieto skratky sú vyznačené na tubách za sériovým číslom a označujú príchuť napríklad 021003S.....jahoda

USKLADNENIE
Uchovávať na chladnom suchom mieste s nízkou vlhkosťou a chrániť pred priamym slnečným svetlom (8-25°C) (46.4-77.0°F). (Trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby)

BALENIE
Tuba s obsahom 40 g (35 mL)
1. Vybavené balení
10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanília, máta, Tutti-Frutti)
2. Balenie s jednou príchuťou
10 x 40 g z každej príchuťi vanília, jahoda, melón, Tutti-Frutti, máta
Napríklad 021003S.....jahoda
1 x 40 g tuba s každou príchuťou

POZNÁMKA
GC Tooth Mousse s jedinčnou receptúrou CPP-ACP bola vyvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrália.

RECALDENT™ je obchodná značka používaná na základe licencie. K technológii CPP-ACP sa vzťahujú patenty alebo nevyhnutne patentové príhľadky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

UPOZORNENIE
1. Tubu po použití vždy uzavrite a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo tuby vždy alebo v uzavretí.
2. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prípadne sa na odveď zmyte vodou.
4. V prípade, že sa objavja akékoľvek príznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzotové konzervačné, prípadne na niektorú zložku výrobku, ako napr. ochucovadla zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Napodujú upravené : 02/2011

Pred uporabo previdno prebrante navodila za uporabo. **SL**

GC Tooth Mousse

TOPIKALNA KREMA Z BIO KALCIJEM I FOSFATOM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

Opis

GC Tooth Mousse je krema na vodni osnovi, ki vsebuje RECALDENT™ (CPP-ACP; kazein-fosfopéptid – amorfní kalcijum fosfat). Pri primeni CPP-ACP v ustno okolje se veže na biofilm, plak, bakterije, hidroksipatit in mehka tkiva in lokalizira bio-prisoten kalcij in fosfat.

Pomembno:
Slina bo pospešila učinkovitost CPP-ACP in okus bo pomagal stimulirati tok slin. Dlje kot čista CPP-ACP in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.

Topikalna pasta, ki vsebuje bio-prisoten kalcij in fosfat
1. Zagotov dovolj zaščitno za zobe.
2. Pomaga neutralizirati kislino z acidogénnih baktérij v plaku.
3. Pomaga neutralizirati kislino z drugih notranjih in zunanjih kislinskih virov.

KONTRAINDIKACIJE
RECALDENT™ (CPP-ACP) izhlaha z mliečne kazeína. Ne uporabljate tege materiálu pri pacientih z dokazom ali sumom na alergijo na mliečne proteine ali prečlivosťovosť ali alergijo na benzoté konzervanče.

NAVODILA ZA UPORABO
INDIKACIJE
a. Pred in po postopku beljenja z bielenji.
b. Po ultrazvukovm ali ročnem luščenju in glajenju korenine.
c. Po profesionalnem občenju zubov.
d. Po profesionalni neutralizaciji kislino z acidogénnych baktérij v plaku.
e. Za zagotovitev topikalnega filma pri bolnikih z erozió, xerostómijo ali Sjögrenovým sindromom.
f. Med ortodontiskim zdravljenjem.
g. Pri pacientih s visokim tveganjem za kariés.
h. Pri pacientih s posebnimi potrebami.

Nanos v ambulanci:
I. Uporaba pripravljene mase
1. Pred uporabo pripravljeno maso možno sperite pod tečúco vodo.
2. Istelejte zajetno količino GC Tooth Mousse na zub in naneste na zgornje ali spodnje zube.
3. Model pustite na mestu v ustih minimalno 3 minúte.
4. Po 3 minútah odstranite maso s površine zuba z gumenim žabčkom.
5. Preostalo GC Tooth Mousse naj pacient z jazykom razprostře po ustih. Tako naj jo zadrži čim dlje (1 – 2 minúty), bolj učinkovit je požiranje. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
6. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja.
7. GC Tooth Mousse, ki ostane na površini se postopoma porazgubi. Po nanosu naj pacient ne je in ne pije 30 minút.
8. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel jazykom v ústach a do najdlhšie ho v ústach zadržal (1-2 minúty) a usvolil sa nevyplávať ani neprechádza. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
9. Požadajte pacienta, aby dôkladne vyplul a ak je možné, nevyplavalo. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
10. Ihneď po použití zvyškú GC Tooth Mousse v ústach opláchnite alebo vyčistíte kefou pod tečúcou vodou.

II. Použitie bez nosiča:
1. Ak je to potrebné, nabyčobno slininy na povrchu zuba odstráňte vatovým tampónom. Na každom pripade NIE je potrebné zuby sušiť stlačeným vzduchom.
2. Naneste GC Tooth Mousse na povrch zuba aplikujúcim tampónom, miestach pomocou interproximálnej kefkou na čistenie zubov.
3. GC Tooth Mousse nechte najmenšie 3 minúty pôsobiť.
4. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrel po celých častiach denticie a čo najdlhšie v ústach podržal (ešte 1-2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
5. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel jazykom v ústach a do najdlhšie ho v ústach zadržal (1-2 minúty) a usvolil sa nevyplávať ani neprechádza. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
6. Požadajte pacienta, aby dôkladne vyplul a ak je možné, nevyplavalo. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.

Domača úprava:
I. Použitie počas dňa po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného lekára
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov.
2. GC Tooth Mousse nechte najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1-2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

II. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

III. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

IV. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

PRÍCHUTE
Jahoda (S), melón (M), vanília (V), máta (I), Tutti-Frutti (T)
Poznámka: S, M, V, I a T v zákrhoch sú skratky pre jednotlivé príchute. Tieto skratky sú vyznačené na tubách za sériovým číslom a označujú príchuť napríklad 021003S.....jahoda

USKLADNENIE
Uchovávať na chladnom suchom mieste s nízkou vlhkosťou a chrániť pred priamym slnečným svetlom (8-25°C) (46.4-77.0°F). (Trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby)

BALENIE
Tuba s obsahom 40 g (35 mL)
1. Vybavené balení
10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanília, máta, Tutti-Frutti)
2. Balenie s jednou príchuťou
10 x 40 g z každej príchuťi vanília, jahoda, melón, Tutti-Frutti, máta
Napríklad 021003S.....jahoda
1 x 40 g tuba s každou príchuťou

POZNÁMKA
GC Tooth Mousse s jedinčnou receptúrou CPP-ACP bola vyvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrália.

RECALDENT™ je obchodná značka používaná na základe licencie. K technológii CPP-ACP sa vzťahujú patenty alebo nevyhnutne patentové príhľadky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

UPOZORNENIE
1. Tubu po použití vždy uzavrite a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo tuby vždy alebo v uzavretí.
2. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prípadne sa na odveď zmyte vodou.
4. V prípade, že sa objavja akékoľvek príznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzotové konzervačné, prípadne na niektorú zložku výrobku, ako napr. ochucovadla zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Napodujú upravené : 02/2011

GC Tooth Mousse

ZUBNA PASTA SA BIORASPOLOŽIVIM KALCIJUMOM I FOSFATOM

Samo za stručnou stomatologiku upotrebu i preporučenoim indikacijama.

Opis

GC Tooth Mousse je zubna pasta na bazi vode koja sadrži RECALDENT™ (CPP-ACP; kazein-fosfopéptid – amorfní kalcijum fosfat). Pri primeni CPP-ACP u oralno okruženje on se veže za biofilm, plak, bakterije, hidroksipatit i meko tkivo i lokalizira bio-prisoten kalcij i fosfat.

Važno:
Saliva poboljšava efikasnost CPP-ACP, a aroma pomaže u stimulaciji salivacije. Što se duže CPP-ACP i saliva zadržuje u ustima, rezultat je bolji.

Površinska pasta koja sadrži biološki raspoloživ kalcij i fosfat
1. Pruža dodatnu zaštitu za zube.
2. Pomaga neutralizirati kislino z acidogénnych baktérij u plaku.
3. Pomaga neutralizirati kislino z drugih unutarnjih i spoljasnih izvora kiselina.

KONTRAINDIKACIJE
RECALDENT™ (CPP-ACP) se dobija iz mliečne kazeína. Nev upotrebuje tege materiálu pri pacientih s dokazom ali sumom na alergiju na mliečne proteine ili prečlivosťovosť ali alergijo na benzoté konzervanče.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
INDIKACIJE
a. Pre i posle postupka beljenja u ordinaciji.
b. Posle ultrazvukovog ili ručnog običenja zuba ili poliranja površine korenja.
c. Posle profesionalnog običenja zuba.
d. Posle primene fluora.
e. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, xerostomije ili Sjögren sindroma.
f. Med ortodontiskim zdravljenjem.
g. Pri pacijentih s visokim rizikom za karijes.
h. Za pacijente sa visokim rizikom karijesa.
i. Za pacijente sa specijalnim potrebama.

Primena u ordinaciji:
I. Primena sa individualnom kašikom
1. Pred uporabu pripremljenu masu možno isprati pod tečúco vodom.
2. Istelejte dobnu količinu GC Tooth Mousse u kašiku i naneti na gornje ili donje zube.
3. Uklonite kašiku.
4. Zubi ostaviti u ustima minimalno 3 minúta.
5. Pacijentu savetovati da jazykom raspodeli preostalu pastu GC Tooth Mousse na ustima. Upititi ga da je zadržu u ustima što je duže moguće (1-2 minúta) a da je ne ispljune ili ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržu u ustima, to je bolji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da dobro ispljune ustima te ako je moguće izbezne ispiranje. Eventualni ostaci paste GC Tooth Mousse na površini mogu da se ostave i postepeno rastvore. Pacijentu savetovati da ne jede i pije 30 minúta posle primene.
7. Ostatak GC Tooth Mousse na kašici isprati pod tečúco vodom odmah posle upotrebe.

II. Primena bez kašike:
1. Pred uporabu pripremljenu masu možno isprati pod tečúco vodom.
2. Naneste isticu količinu GC Tooth Mousse na zobno površino z gobicu za nanaganje, otklanjajući materijal koji je u teško dostupna interproximalna područja z Tooth Cleaning Brush.
3. Pustite GC Tooth Mousse na mestu minimalno 3 minúte.
4. Preostalo GC Tooth Mousse naj pacient z jazykom razprostře po ustih. Tako naj jo zadrži čim dlje (naslednji 1 – 2 minúty), bolj učinkovit je požiranje. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkovit je rezultat.
5. Pacient naj nato močno izpljune, po možnosti brez spiranja.
6. GC Tooth Mousse, ki ostane na površini se postopoma porazgubi. Po nanosu naj pacient ne je in ne pije 30 minút.
7. Inštruujte pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel jazykom v ústach a do najdlhšie ho v ústach zadržal (1-2 minúty) a usvolil sa nevyplávať ani neprechádza. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
8. Požadajte pacienta, aby dôkladne vyplul a ak je možné, nevyplavalo. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.

Domača úprava:
I. Použitie počas dňa po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného lekára
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom ili vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov.
2. GC Tooth Mousse nechte najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1-2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

II. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

III. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

IV. Použitie na noc po vyčistení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu
1. Dostatočné množstvo GC Tooth Mousse - najmenie vo veľkosti hrubku na každý obok - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčinkou. Na každé dostupné (medzubybné) priestory použite interproximálnu kefkou na čistenie zubov alebo zubnú niť u GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechte na zuboch najmenšie 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (ešte 1 - 2 minúty), pritom nevyplávať a neprehliada. Čím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržia v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Dôkladne vyplňte a ak je to možné, nevyplavajte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozpýtal. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

PRÍCHUTE
Jahoda (S), dinja (M), vanília (V), nana (I) Tutti-frutti (T).
Poznámka: S, M, V, I a T v zákrhoch sú skratky pre jednotlivé príchute. Tieto skratky sú vyznačené na tubách za sériovým číslom a označujú príchuť napríklad 021003S.....jahoda

USKLADNENIE
Uchovávať na chladnom suchom mieste s nízkou vlhkosťou a chrániť pred priamym slnečným svetlom (8-25°C) (46.4-77.0°F). (Trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby)

BALENIE
Tuba o 40g (35ml)
1. Aсорtíam
10 x 40g (po 2 kusova jahoda, melone, vanilije, mint, tutti-frutti)
2. Paketi z enim okusom
10 x 40g, okusi vanilije, jahoda, melone, tutti-frutti, minta
3. Dodatni paket
1 x 40g tuba vposameznej jahoda

NAVODILO
10 Tubo izlozava se svojo edinstvenno CPP-ACP formulacijo je bil razvit v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourne, Victoria, Avstralija. "RECALDENT" je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco. CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

UPOZORENJE
1. Tubo po uporabi vedno zaprite s znotrajnim in odstranite preostalo pasto ali vlagi okrog vratu tube ali znotraj pokrova.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in po potrebi pomoč zdravniku.
3. V primeru pojavnja simptomov angioedema, lahko to kaže na občutljivost ali alergijo na benzotale ali katero drugo komponento izdelka, kot je dodatek za okus. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

POZNANJE
Pasta GC Tooth Mousse sa svojim jedinstvenom CPP-ACP formulom razvijena je na Stomatološkem fakultetu Univerzeta v Melbourne, Victoria, Avstralija.

RECALDENT™ je registrirani zaštiten znak. CPP-ACP tehnologija je patentirana ili prijavljena za patent u Australiji, Novom Zelandu, Evropi, Kanadi i SAD-u.

UPOZORENJE
1. Tubo posle upotrebe vedno odmah zatvoriti i pažljivo odstraniti višak paste na vratu tube.
2. U slučaju stavljanja sa očima odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. U slučaju prolijanja po oči, isprati toplom vodom.
4. Pojava simptoma angioedema može ukazivati na osetljivost ili alergiju na benzoté konzervanče ili neku drugu komponentu proizvoda kao što je aroma. U tom slučaju upotrebu treba prekinuti i potražiti lekara.

Poslednja revizija : 02/2011

Pre upotrebu pažljivo pročitati uputstvo. **SR**